

Chapitre 8

Probabilités conditionnelles

I. Rappels

Définition 1

- Une **expérience aléatoire** est une expérience dont le résultat dépend du hasard. Chacun des résultats possibles s'appelle **éventualité** ou **issue**. L'ensemble Ω (ou E) de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire s'appelle l'**univers** de l'expérience.
- Un **événement** A est une partie de l'univers Ω (un événement peut donc être constitué de zéro, une ou plusieurs issues de Ω).
- Un **événement élémentaire** est une partie de Ω qui ne contient qu'une seule issue.
- L'**événement contraire** de A , noté $\bar{A}$, est la partie constituée de toutes les issues de Ω qui ne sont pas dans A .

Propriété 2

- La probabilité d'un événement A , notée $P(A)$, est la **somme des probabilités des événements élémentaires inclus dans A** .
- Pour tout événement A , on a $0 \leq P(A) \leq 1$.
- La somme des probabilités des événements élémentaires vaut 1.
- La probabilité de l'événement contraire d'un événement A est : $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

Définition 3

Lorsque tous les événements élémentaires d'une expérience aléatoire ont la même probabilité, on dit alors qu'ils sont **équiprobables**. On parle d'**expérience équiprobable** ou de **loi équirépartie**.

Définition 4

- L'événement « **A et B** », noté $A \cap B$, s'appelle l'**intersection** des événements A et B . Il est réalisé lorsque **les deux événements sont réalisés simultanément**.
- L'événement « **A ou B** », noté $A \cup B$, s'appelle la **réunion** des événements A et B . Il est réalisé lorsqu'**au moins l'un des deux événements est réalisé**.

Théorème 5

- Soit A et B deux événements d'une même expérience aléatoire. On a alors :
 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
- Si deux événements A et B sont **incompatibles**, alors $A \cap B = \emptyset$ et $P(A \cap B) = 0$.
Pour conséquence, on en déduit que $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

II. Probabilités conditionnelles

II.1 Probabilité de l'événement B sachant que A est réalisé

Définition 6

Soit A et B deux événements d'un univers Ω avec $P(A) \neq 0$.

La **probabilité conditionnelle** que l'événement B se réalise sachant que l'événement A est réalisé est notée $P_A(B)$, et elle est définie par :

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Remarques

- $P_A(B)$ se lit « probabilité de B sachant A ».
- La formule s'écrit aussi de la manière suivante : $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$.
- Si la probabilité de l'événement B est également non nulle, on peut définir la probabilité conditionnelle que l'événement A se réalise sachant que l'événement B est réalisé, notée $P_B(A)$ et définie par :

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Propriété 7

La probabilité $P_A(B)$ vérifie bien $0 \leq P_A(B) \leq 1$ et $P_A(B) + P_A(\bar{B}) = 1$.

Propriété 8

Soit A et B deux événements d'un univers Ω avec $P(A) \neq 0$ et $P(B) \neq 0$. Alors :

$$P(A) \times P_A(B) = P(B) \times P_B(A)$$

Remarque

Cette égalité peut être utile si une de ces probabilités est à déterminer en connaissant les trois autres.

Exemple

Un sachet de 100 bonbons contient 40 bonbons acidulés, les autres bonbons sont à la guimauve. 18 des bonbons à la guimauve sont au parfum orange et 10 des bonbons acidulés sont au parfum orange. Les bonbons qui ne sont pas au parfum orange sont à la fraise.

On choisit un bonbon au hasard dans ce sachet. On note les événements suivants :

A : « Le bonbon est acidulé »

G : « Le bonbon est à la guimauve »

F : « Le bonbon est à la fraise »

O : « Le bonbon est au parfum orange »

De l'énoncé découle immédiatement la probabilité des événements A, G et $A \cap O$:

$$P(A) = \frac{40}{100} = 0,4, \quad P(G) = \frac{60}{100} = 0,6 \quad \text{et} \quad P(A \cap O) = \frac{10}{100} = 0,1.$$

De plus comme 18 des bonbons à la guimauve sont au parfum orange, on en déduit également une probabilité conditionnelle : la probabilité O sachant l'événement G :

$$P_G(O) = \frac{18}{60} = 0,3$$

À partir de ces données, on peut déduire la probabilité d'autres événements. À titre d'exemples :

- La probabilité que le bonbon choisi au hasard dans ce sachet soit un bonbon au parfum orange sachant qu'il est acidulé est :

$$P_A(O) = \frac{P(A \cap O)}{P(A)} = \frac{0,1}{0,4} = 0,25$$

- La probabilité que le bonbon choisi au hasard dans ce sachet soit un bonbon à la guimauve et au parfum orange est :

$$P(G \cap O) = P_G(O) \times P(G) = 0,3 \times 0,6 = 0,18$$

II.2 Utilisation de tableaux

Les tableaux à double entrées permettent une présentation claire de certaines expériences aléatoires et facilitent le calcul des probabilités conditionnelles.

	B	$\bar{B}$	Total
A	$P(A \cap B)$	$P(A \cap \bar{B})$	$P(A)$
$\bar{A}$	$P(\bar{A} \cap B)$	$P(\bar{A} \cap \bar{B})$	$P(\bar{A})$
Total	$P(B)$	$P(\bar{B})$	1

Définition 9

- $P(A \cap B)$ se lit à l'intersection de la ligne A et de la colonne B.
- $P(A)$ (respectivement $P(B)$) se lit sur la dernière colonne (respectivement la dernière ligne).
- $P_A(B)$ (ou $P_B(A)$) s'obtient en calculant le quotient des deux probabilités adéquates :

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \quad \text{et} \quad P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Exemple

Un club sportif rassemble 180 membres répartis en juniors et seniors. On compte 135 seniors dont 81 hommes. Il y a 27 garçons parmi les juniors.

En choisissant une femme au hasard, calculer la probabilité d'avoir une junior.

	J	S	Total
H	$\frac{27}{180}=0,15$	$\frac{81}{180}=0,45$	$0,15+0,45=0,6$
F	0,1	0,3	0,4
Total	0,25	$\frac{135}{180}=0,75$	1


On a $P_F(J) = \frac{P(F \cap J)}{P(F)} = \frac{0,1}{0,4} = 0,25$.

III. Arbre pondéré et calculs de probabilité

Dans certains cas, il s'avère utile de traduire une situation ou de modéliser une expérience aléatoire par un arbre. La construction de cet arbre peut permettre par exemple de dénombrer.

On y indique les probabilités des événements considérés. On parle alors d'un **arbre pondéré** ou **arbre de probabilités**.

On reprend l'exemple de la partie I, qui peut être modélisé par l'arbre pondéré suivant :



Le **premier niveau** de l'arbre précise les deux types possibles (guimauve ou acidulé) du bonbon choisi au hasard dans le sachet. On indique sur les branches du premier niveau issues du nœud les probabilités correspondant au fait qu'il soit à la guimauve ou acidulé.

Le **deuxième niveau** de l'arbre indique les parfums possibles sachant le type du bonbon. Ce deuxième niveau est composé de deux branches issues du nœud G et de deux branches issues du nœud A . On indique sur les branches de ce deuxième niveau les probabilités que le bonbon soit au parfum orange ou au parfum fraise sachant qu'il est à la guimauve ou acidulé. Ce sont les **probabilités conditionnelles** de l'événement F ou O sachant l'événement G ou A .

Chaque succession de branches est appelé **chemin**. Cet arbre a donc quatre chemins qui sont les événements $G \cap O$, $G \cap F$, $A \cap O$ et $A \cap F$. Ces chemins sont sur un même niveau, ce qui n'est pas toujours le cas, car un arbre n'est pas nécessairement symétrique (c'est un cas qui arrive rarement mais qui existe).

Généralement, les données dont on dispose ne nous permettent pas d'indiquer immédiatement sur toutes les branches d'un arbre pondéré les probabilités correspondantes. On a recours pour les déterminer à certaines règles qui découlent de la définition de la probabilité conditionnelle et des propriétés de sa loi.

Propriété 10

- La probabilité de l'événement correspondant à un chemin est obtenue en multipliant les probabilités portées par ses branches.
- La somme des probabilités sur les branches partant d'un même nœud est égale à 1.
- La probabilité de l'événement correspondant à plusieurs chemins est obtenue en additionnant les probabilités de chacun de ces chemins (**formule des probabilités totales**).

Exemple

• La probabilité d'un chemin est le produit des probabilités indiquées sur les branches du chemin qui aboutissent à ce chemin. Donc :

$$P(G \cap O) = P(G) \times P_G(O) = 0,6 \times 0,3 = 0,18$$

$$P(A) \times P_A(O) = P(A \cap O), \text{ c'est-à-dire } 0,4 \times P_A(O) = 0,1. \text{ Par suite, } P_A(O) = \frac{0,1}{0,4} = 0,25$$

• La somme des probabilités indiquées sur les branches issues d'un même nœud est égale à 1. Donc :

$$\text{À partir du nœud } G : P_G(O) + P_G(F) = 1 \text{ donc } P_G(F) = 1 - 0,3 = 0,7$$

$$\text{À partir du nœud } A : P_A(O) + P_A(F) = 1 \text{ donc } P_A(F) = 1 - 0,25 = 0,75$$

Ces deux probabilités étant connues, on peut à l'aide de la propriété 3 utilisée au point 1 (probabilité d'un chemin) déterminer les deux autres probabilités :

$$P(G \cap F) = P(G) \times P_G(F) = 0,6 \times 0,7 = 0,42$$

$$P(A \cap F) = P(A) \times P_A(F) = 0,4 \times 0,75 = 0,3$$

• Une fois l'arbre pondéré complété, on peut être amené à déterminer la probabilité d'un événement qui ne peut pas être directement lue sur l'arbre. Dans l'exemple précédent, on peut s'intéresser à la probabilité que le bonbon choisi au hasard dans le sachet soit à la fraise. Il suffit dans ce cas d'appliquer la formule des probabilités totales :

L'événement F est associé au chemin $A \cap F$ et au chemin $G \cap F$. Par la **formule des probabilités totales**, on obtient :

$$P(F) = P(A \cap F) + P(G \cap F) = 0,3 + 0,42 = 0,72$$

La probabilité qu'un bonbon choisi au hasard dans le sachet soit à la fraise est de 0,72.

On généralise par la suite la **formule des probabilités totales**.

IV. Indépendance

IV.1 Indépendance de deux événements

Définition 11

Soit A et B deux événements d'un univers Ω . On dit que A et B sont **indépendants** lorsque $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

Propriété 12

Soit A et B deux événements d'un univers Ω tels que $P(A) \neq 0$.
Les événements A et B sont **indépendants** si et seulement si $P_A(B) = P(B)$.

Exemple

Soit A et B deux événements indépendants tels que $P(A) = 0,8$ et $P(B) = 0,35$.
Alors $P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = 0,8 \times 0,35 = 0,28$.

IV.2 Succession de deux épreuves indépendantes

Définition 13

En réalisant successivement deux expériences aléatoires telles que les événements associés à la première soit indépendants des événements associés à la seconde, on dit que l'on réalise une **succession de deux épreuves indépendantes**.

Définition 14

Deux expériences sont dites **indépendantes** si le résultat de l'une n'influe pas sur le résultat de l'autre.

Exemple

On lance quatre fois de suite une pièce de monnaie. Ces expériences sont indépendantes car le résultat de la première expérience n'influe pas sur le résultat de la deuxième et il en va de même pour les autres.

Définition 15

Deux expériences sont dites **identiques** si elles ont les mêmes issues et les mêmes probabilités pour chaque issue.

Exemple

On lance quatre fois de suite une pièce de monnaie. Ces expériences sont identiques car chaque issue possède la même probabilité.

Définition 16

Dans une succession d'épreuves indépendantes, la probabilité d'une issue est le **produit des probabilités rencontrées sur le chemin** qui conduit à cette issue.

Exemple

On lance quatre fois de suite une pièce de monnaie. La probabilité de tomber, dans cet ordre, sur deux piles et deux faces est $P(((P; P; F; F))) = 0,5 \times 0,5 \times 0,5 \times 0,5 = 0,0625$.