

- sindrome serotonergica che si manifesta con alterazioni dello stato mentale, aumento della pressione, agitazione, contrazioni brevi e involontarie dei muscoli, aumento dei riflessi, sudorazione eccessiva, brividi e tremori.
- Agitazione
- Mal di testa
- Ipersensibilità (allergia)
- Rash (eruzione cutanea)
- Urticaria, (irritazione della pelle)
- Angioedema (gonfiore del viso, degli occhi, delle labbra, della gola che possono causare difficoltà nella respirazione e nella deglutizione)
- Confusione
- Insomnia (difficoltà a dormire)
- Diarrea

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare BRONCHENOLO TOSSE

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non sono necessarie particolari precauzioni per la conservazione.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo Scad. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Dopo la prima apertura utilizzare il medicinale entro 12 mesi.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente. Smaltire il misurino secondo le normative locali per i rifiuti domestici in plastica.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene BRONCHENOLO TOSSE

Il principio attivo è: destrometorfano bromidrato.

100 ml di sciroppo contengono: 154 mg destrometorfano bromidrato.

Gli altri componenti sono: sodio citrato; acido citrico monodrato; alcool etilico; saccarosio liquido; aroma limone; aroma menta; metile para-idrossibenzoato; acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di BRONCHENOLO TOSSE e contenuto della confezione

Flacone in vetro da 150 ml con chiusura a prova di bambino, contenente sciroppo, e bicchiere dosatore graduato.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Perrigo Italia S.r.l. - Viale dell'Arte, 25 - 00144 Roma

Produttore

Farmaclair - 440 Avenue du General de Gaulle - Herouville Saint Clair - Francia.

Questo Foglio Illustrativo è stato aggiornato: Luglio 2025

Le informazioni amministrative specifiche del dispositivo medico (bicchiere dosatore) sono fornite nella sezione seguente

Misurino Dosatore: "PF/FF" ml. 2,5-5,7,5-10-15

MD : Dispositivo Medico

CE 0546

CAPSULIT SPA, IT- 20877 RONCELLO (MB)
VIA LOMBARDIA 5 - ITALY

Ultima revisione: 10/24

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede il consumatore e/o il paziente.

LOT : Si prega di visionare l'etichetta esterna del prodotto

UDI : Si prega di visionare l'etichetta esterna del prodotto



8 050593 770721

4 LF01831G_8P550A00

Bronchenolo®

TOSSE

1,54 mg/ml sciroppo

Destrometorfano bromidrato

Leggi attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 5-7 giorni di trattamento.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è BRONCHENOLO TOSSE e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere BRONCHENOLO TOSSE
3. Come prendere BRONCHENOLO TOSSE
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare BRONCHENOLO TOSSE
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è BRONCHENOLO TOSSE e a cosa serve

Questo medicinale contiene destrometorfano bromidrato, un principio attivo appartenente alla classe dei medicinali sedativi della tosse.

BRONCHENOLO TOSSE è utilizzato per calmare la tosse.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo 5-7 giorni di trattamento.

2. Cosa deve sapere prima di prendere BRONCHENOLO TOSSE

Non prenda BRONCHENOLO TOSSE se:

- è allergico al destrometorfano bromidrato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- sta assumendo o ha assunto nelle ultime due settimane medicinali usati contro la depressione chiamati inibitori delle monoamino-ossidasi (IMAO);
- ha o rischia di avere problemi respiratori (insufficienza respiratoria), per esempio ha malattie croniche ostruttive delle vie respiratorie, polmonite, un attacco di asma in corso o aggravamento dell'asma.

Non usare BRONCHENOLO TOSSE in bambini con meno di 6 anni di età.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere BRONCHENOLO TOSSE se:

- ha tosse da lungo tempo (cronica o persistente), come quella che si manifesta in caso di asma (una malattia che causa restringimento e infiammazione dei bronchi) o enfisema (una malattia dei polmoni che causa difficoltà respiratorie);
- la tosse è accompagnata da catarro;
- la tosse non diminuisce o peggiora nonostante il trattamento o se è accompagnata da febbre alta, eruzione della pelle o cefalea (mal di testa);
- ha gravi problemi al fegato o ai reni;

1 LF01831G_8P550A00

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

BRONCHENOLO TOSSE può causare sonnolenza e vertigini, pertanto può alterare la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Faccia particolare attenzione qualora dovesse svolgere tali attività.

BRONCHENOLO TOSSE contiene:

- saccarosio liquido; contiene 17,2 g di saccarosio (zucchero) per dose (15 ml). Da tenere in considerazione in persone affette da diabete mellito. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale;
- metile para-idrossibenzoato, può causare reazioni allergiche (anche ritardate);
- alcool etilico. Questo medicinale contiene 576 mg di alcool (etanolo) per dose (15 ml). La quantità in 15 ml di questo medicinale è equivalente a 14 ml di birra e 6 ml di vino. La quantità di alcol in questo medicinale non sembra avere effetto su adulti e adolescenti e i suoi effetti nei bambini non sono evidenti. Potrebbero verificarsi alcuni effetti nei bambini piccoli, per esempio sentirsi assennati. L'alcol in questo medicinale può alterare gli effetti di altri medicinali. Parli con il medico o il farmacista se sta assumendo altri medicinali. Se è incinta o sta allattando al seno, parli con il medico o il farmacista prima di assumere questo medicinale. Se ha una dipendenza da alcol, parli con il medico prima di assumere questo medicinale;
- sodio. Questo medicinale contiene meno di 1 mmole di sodio (23 mg), cioè da considerare essenzialmente senza sodio.

3. Come prendere BRONCHENOLO TOSSE

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

L'uso deve essere limitato al periodo più breve possibile e alla dose più bassa possibile.

Adulti e adolescenti al di sopra dei 12 anni

La dose raccomandata è 15 ml 3 - 4 volte al giorno con un intervallo minimo tra le dosi di 4 ore. La dose massima giornaliera è 60 ml. Non superare la dose massima giornaliera raccomandata.

Bambini tra i 6 e i 12 anni di età

La dose raccomandata è 7,5 ml 3 - 4 volte al giorno con un intervallo minimo tra le dosi di 4 ore. La dose massima giornaliera è 30 ml. Non superare la dose massima giornaliera raccomandata.

1 ml di sciroppo contiene: 1,54 mg di destrometorfano bromidrato.

Non usare BRONCHENOLO TOSSE per più di 5 giorni.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo 5 giorni di trattamento.

Modo di somministrazione

BRONCHENOLO TOSSE sciroppo deve essere preso per bocca, usando il bicchiere dosatore (misurino), come di seguito riportato:

1. Aprire il flacone premendo e ruotando contemporaneamente il tappo in senso antiorario.
2. Per un corretto dosaggio, si raccomanda di mantenere il misurino in posizione orizzontale e di riempirlo fino alla taca del livello corrispondente alla dose da assumere.
3. Bere immediatamente lo sciroppo direttamente dal misurino.
4. Chiudere il flacone premendo con decisione e avvitando il tappo.
5. Lavare il misurino dopo ogni utilizzo.

Se prende più BRONCHENOLO TOSSE di quanto deve:


Se si assume più BRONCHENOLO TOSSE del dovuto, si possono manifestare i seguenti sintomi: nausea e vomito, contrazioni muscolari involontarie, agitazione, confusione, sonnolenza, disturbi cognitivi, movimenti oculari involontari e rapidi, disturbi cardiaci (battito cardiaco accelerato), disturbi di coordinazione, psicosi con allucinazioni visive e ipereccitabilità.

Altri sintomi in caso di sovradosaggio massivo possono essere: coma, gravi problemi respiratori (depressione respiratoria) e convulsioni.

Rivolgersi al medico o all'ospedale immediatamente se si verifica uno dei sintomi sopracitati.

Se dimentica di prendere BRONCHENOLO TOSSE

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.



4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Informi il medico se durante il trattamento con BRONCHENOLO TOSSE nota:

Effetti indesiderati non comuni (possono interessare fino a 1 persona su 100)

- sonnolenza e vertigini;
- disturbi all'addome, allo stomaco o all'intestino, nausea, vomito;

3

LF01831G_8P550A00

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno, chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Gravidanza e allattamento

Non sono disponibili dati clinici per il rischio in gravidanza e durante l'allattamento con latte materno.

BRONCHENOLO TOSSE deve essere usato solo in caso di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico.

Fertilità

Non sono disponibili dati.

2